離散凸解析と ゲーム理論のレビュー

田村明久 (慶應義塾大学 理工学部)

目次

- 離散凸解析
 - 離散凸解析とは
 - $M^{\natural}$ 凹関数の定義と性質
- $M^{\natural}$ 凹関数を用いたマッチングモデル
 - 割当モデル
 - 結婚モデル
 - 上下制限付き割当モデル

離散凸解析とは

- 離散最適化で凸性を扱うパラダイム
マトロイド理論 + 凸解析
- 2種類の離散凸性
劣モジュラ関数 ← 等価 → 基底 (マトロイド)
↓ ↓
L凸関数 ← 共役 → M凸関数
- 双対性 (最大最小定理, 離散分離定理)
- 効率的な最適化アルゴリズム
- 応用 (行列, 経済モデル, 資源配分問題等)

離散凸解析とは

$$\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \geq f(\lambda x + (1-\lambda)y)$$

離散凸解析とは

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

5

目次

- 離散凸解析
 - 離散凸解析とは
 - $M^{\natural}$ 凹関数の定義と性質
- $M^{\natural}$ 凹関数を用いたマッチングモデル
 - 割当モデル
 - 結婚モデル
 - 上下制限約付き割当モデル

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

6

準備

E : 不可分財の集合

$x \in \mathbf{Z}^E$: 財ベクトル

$f: \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ 主体の評価関数 (貨幣価値換算)

$\text{dom } f = \{x \in \mathbf{Z}^E \mid f(x) \in \mathbf{R}\}$ 実効定義域

$p \in \mathbf{R}^E$: 価格ベクトル

$f[-p](x) = f(x) - \sum_{e \in E} p(e)x(e)$ 主体の利得

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

7

$M^{\natural}$ 凹関数

$f: \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$, $\text{dom } f = \{x \in \mathbf{Z}^E \mid f(x) \neq -\infty\}$

$\chi_u \in \{0, 1\}^E$: $\chi_u(u) = 1$, $\chi_u(e) = 0$ ($e \neq u$)

$\chi_0 = (0, \dots, 0)$

f : $M^{\natural}$ 凹関数 [Murota 1996, Murota-Shioura 1999]

$\Downarrow$ def

$\forall x, y \in \text{dom } f$, $\forall u \in \{e \in E \mid x(e) > y(e)\}$,

$\exists v \in \{0\} \cup \{e \in E \mid x(e) < y(e)\}$:

$$f(x) + f(y) \leq f(x - \chi_u + \chi_v) + f(y + \chi_u - \chi_v)$$

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

8

M[#]凹関数

$$\forall x, y \in \text{dom } f, \quad \forall u \in \{e \in E \mid x(e) > y(e)\}, \\ \exists v \in \{0\} \cup \{e \in E \mid x(e) < y(e)\}: \\ f(x) + f(y) \leq f(x - \chi_u + \chi_v) + f(y + \chi_u - \chi_v)$$

点が1歩ないし2歩だけ近づいたとき、関数値の和が増加する

通常の凹関数:
2点を結ぶ直線上を互いに等距離近づくと、関数値の和は増加する
↓
整数性を保存するために調整が必要

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

9

M凹関数

dom f が $\{x : \sum x(e) = \text{const.}\}$ という超平面上にのる M[#]凹関数 f を **M凹関数** という

$$f: \text{M凹関数} \quad [\text{Murota 1996}] \\ \Downarrow \text{def} \\ \forall x, y \in \text{dom } f, \quad \forall u \in \{e \in E \mid x(e) > y(e)\}, \\ \exists v \in \{0\} \cup \{e \in E \mid x(e) < y(e)\}: \\ f(x) + f(y) \leq f(x - \chi_u + \chi_v) + f(y + \chi_u - \chi_v)$$

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

10

M[#]凹関数の例

層型凹関数

$T \subseteq 2^E$: 層族

$X, Y \in T \Rightarrow X \cap Y = \emptyset \text{ or } X \subseteq Y \text{ or } Y \subseteq X$

$f_Y: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ T の各元 Y に対する凹関数

$$f(x) = \sum_{Y \in T} f_Y(x(Y)) \quad (x \in \mathbf{Z}^E)$$

$$x(Y) = \sum_{i \in Y} x(i)$$

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

11

M[#]凹関数の最適性

[Murota 1996]

定理 M[#]凹関数 $f: \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ に対して

$x \in \arg \max f$ (f の最大解集合)

$\Downarrow$

$f(x) \geq f(x + \chi_u - \chi_v) \quad (\forall u, v \in E \cup \{0\})$

$n = |E|$, $L = \|\text{dom } f\|_\infty$ としたとき n と $\log L$ に関する多項式時間で最大解が求まる

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

12

M^h凹関数の和の最適性

M^h凹関数 + M^h凹関数 ≠ M^h凹関数

M^h凹交叉定理 [Murota 1996]

$$f_1, f_2 : \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\} \quad \text{M}^h\text{凹関数}$$

$$x \in \arg \max (f_1 + f_2)$$

$$\exists p \in \mathbf{R}^E : x \in \arg \max f_1[+p] \cap \arg \max f_2[-p]$$

M^h凹関数の性質

- ・凹拡張可能性 [Murota 1996]
- ・劣モジュラ性 [Murota-Shioura 2001]
- ・単改良性 [Fujishige-Yang 2003]
- ・粗代替性 [Fujishige-Yang 2003]
[Danilov-Koshevoy-Lang 2003], [Murota-T. 2003]
- ・代替性 [Fujishige-T. 2003]
[Farooq-T. 2004], [Farooq-Shioura 2005]

M^h凹関数の性質: 凹拡張可能性

- ・凹拡張可能性 [Murota 1996]

$$\exists \bar{f}: (\text{連続})\text{凹関数}, \quad \bar{f}(x) = f(x) \quad (\forall x \in \mathbf{Z}^E)$$

凹拡張可能

凹拡張不可能

M^h凹関数の性質: 劣モジュラ性

- ・劣モジュラ性 (限界効用逓減性) [Murota-Shioura 2001]

$$f(x) + f(y) \geq f(x \vee y) + f(x \wedge y) \quad (\forall x, y \in \mathbf{Z}^E)$$

M^h凹関数の性質:粗代替性

E : 不可分財の集合

$x \in \mathbf{Z}^E$: 財ベクトル

$p \in \mathbf{R}^E$: 価格ベクトル

$f: \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R}$ 消費者の評価関数(貨幣価値に換算)

$f[-p](x) = f(x) - \sum_{e \in E} p(e)x(e)$ 消費者の利得

- 粗代替性 [Kelso-Crawford 1988]

$$(\text{GS}_W) \forall p, q \in \mathbf{R}^E (p \leq q), \forall x \in \arg \max f[-p], \\ \exists y \in \arg \max f[-q]: p(e) = q(e) \Rightarrow y(e) \geq x(e)$$

M^h凹関数の性質:粗代替性

[Fujishige-Yang 2003]

定理 $f: \{0,1\}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ に対して
 $f: \text{M}^h \text{凹関数} \Leftrightarrow f: (\text{GS}_W)$

$$(\text{GS}_W) \forall p, q \in \mathbf{R}^E (p \leq q), \forall x \in \arg \max f[-p], \\ \exists y \in \arg \max f[-q]: p(e) = q(e) \Rightarrow y(e) \geq x(e)$$

M^h凹関数の性質:粗代替性

[Danilov-Koshevoy-Lang 2003]

(SWGS) $\forall p \in \mathbf{R}^E, \forall x \in \arg \max f[-p], \forall e \in E,$

(i) $\forall \alpha > 0: x \in \arg \max f[-p - \alpha \chi_e]$ or

(ii) $\exists \alpha > 0, \exists y \in \arg \max f[-p - \alpha \chi_e]:$

$y(e) = x(e) - 1, y(e') \geq x(e') (e' \neq e)$

定理 $f: \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ に対して

- (1) $f: \text{M}^h \text{凹関数} \Rightarrow f: (\text{SWGS})$
- (2) $f: \text{凹拡張可能なとき}$
 $f: (\text{SWGS}) \Rightarrow f: \text{M}^h \text{凹関数}$

M^h凹関数の性質:粗代替性

[Murota-T. 2003]

(GS) $\forall (p, p_0) \leq (q, q_0) \in \mathbf{R}^{E \cup \{0\}}, \forall x \in \arg \max f[-p + p_0 \mathbf{1}],$

$\exists y \in \arg \max f[-q + q_0 \mathbf{1}]:$

$[p(e) = q(e) \Rightarrow y(e) \geq x(e)] \text{ and } [p_0 = q_0 \Rightarrow y(E) \leq x(E)]$

定理 $f: \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ に対して

- (1) $f: \text{M}^h \text{凹関数} \Rightarrow f: (\text{GS})$
- (2) $f: \text{凹拡張可能, dom } f: \text{有界なとき}$
 $f: (\text{GS}) \Rightarrow f: \text{M}^h \text{凹関数}$

M^h凹関数の性質: 単改良性

[Gul-Stacchetti 1999]

(SI_W) $\forall p \in \mathbf{R}^E, \forall x \in \text{dom } f - \arg \max f[-p],$

$\exists i, \exists j \in E \cup \{0\} : f[-p](x) < f[-p](x - \chi_i + \chi_j)$

[Murota-T. 2003]

(SI) $\forall p \in \mathbf{R}^E, \forall x, \forall y \in \mathbf{Z}^E$ with $-\infty < f[-p](x) < f[-p](y),$

$\exists i \in \text{supp}^+(x-y) \cup \{0\}, \exists j \in \text{supp}^-(x-y) \cup \{0\} :$

$f[-p](x) < f[-p](x - \chi_i + \chi_j)$

$\text{supp}^+(x-y) = \{e \in E \mid x(e) > y(e)\}$

$\text{supp}^-(x-y) = \{e \in E \mid x(e) < y(e)\}$

M^h凹関数の性質: 単改良性

[Murota-T. 2003]

定理 $f: \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ に対して

(1) $f: \text{M}^h \text{凹関数} \Rightarrow f: (\text{SI}_W), (\text{SI})$

(2) $f: \text{凹拡張可能なとき}$

$f: (\text{SI}) \Rightarrow f: \text{M}^h \text{凹関数}$

M^h凹関数の性質

定理 $f: \{0,1\}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ に対して

$\text{M}^h \text{凹性} \Leftrightarrow (\text{GS}_W) \Leftrightarrow (\text{GS}) \Leftrightarrow (\text{SWGS})$

$\Leftrightarrow (\text{SI}_W) \Leftrightarrow (\text{SI})$

代替性

- X : 有限集合
- $C: 2^X \rightarrow 2^X$ s.t. $C(Y) \subseteq Y$ for any $Y \subseteq X$
- C が代替性を満たすとは

$$\forall X' \subseteq \forall Y' \subseteq X : X' \cap C(Y') \subseteq C(X')$$

$$\forall X' \subseteq \forall Y' \subseteq X : X' - C(X') \subseteq Y' - C(Y')$$

M^h凹性と代替性

[Fujishige-T. 2003]

補題 $f : M^h$ 凹関数, $z_1, z_2 \in Z^E (z_1 \geq z_2)$

(SC₁) $\forall x_1 \in \arg \max \{f(y) \mid y \leq z_1\},$

$\exists x_2 \in \arg \max \{f(y) \mid y \leq z_2\} : z_2 \wedge x_1 \leq x_2$

(SC₂) $\forall x_2 \in \arg \max \{f(y) \mid y \leq z_2\},$

$\exists x_1 \in \arg \max \{f(y) \mid y \leq z_1\} : z_2 \wedge x_1 \leq x_2$

(SC₁) 定員が減少したとき $(x \wedge y)(e) = \min \{x(e), y(e)\}$

$z_2(e) \leq x_1(e) \Rightarrow x_2(e) = z_2(e)$

$x_1(e) < z_2(e) \Rightarrow x_1(e) \leq x_2(e)$

M^h凹性と代替性

[Fujishige-T. 2003]

補題 $f : M^h$ 凹関数, $z_1, z_2 \in Z^E (z_1 \geq z_2)$

(SC₁) $\forall x_1 \in \arg \max \{f(y) \mid y \leq z_1\},$

$\exists x_2 \in \arg \max \{f(y) \mid y \leq z_2\} : z_2 \wedge x_1 \leq x_2$

(SC₂) $\forall x_2 \in \arg \max \{f(y) \mid y \leq z_2\},$

$\exists x_1 \in \arg \max \{f(y) \mid y \leq z_1\} : z_2 \wedge x_1 \leq x_2$

(SC₂) 定員が増加したとき $(x \wedge y)(e) = \min \{x(e), y(e)\}$

$x_2(e) = z_2(e) \Rightarrow x_1(e) : \text{制限なし}$

$x_2(e) < z_2(e) \Rightarrow x_1(e) \leq x_2(e)$

M^h凹性と代替性

[Farooq-T. 2004]

定理 $f : \{0,1\}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ に対し以下は同値

(1) f は M^h 凹関数

(2) 任意の $p \in \mathbf{R}^E$ に対し $f[-p]$ が (SC₁) を満たす

(3) 任意の $p \in \mathbf{R}^E$ に対し $f[-p]$ が (SC₂) を満たす

• $\text{dom } f$ が有界な場合へ拡張 [Farooq-Shioura 2005]

M^h凹性と代替性

- 代替的な選好順序 $\{3\} \succ \{1,2\} \succ \{2\} \succ \{1\}$ を表現する M^h 凹関数は存在しない
- 代替性は M^h 凹性より広い概念

離散凸解析を用いたモデル

不可分財を扱うモデル

- Arrow-Debreu型モデル [Danilov-Koshevoy-Murota 2001]
- 代替財と補完財が混在するモデル [Danilov-Koshevoy-Lang 2003]
- 組合せオークション [Lehmann-Lehmann-Nisan 2006]
- 結婚モデルの拡張 [Eguchi-Fujishige 2002; Eguchi-Fujishige-T. 2003]
- 結婚モデルと割当モデルの統一モデル [Fujishige-T. 2006, 2007]

目次

- 離散凸解析
 - 離散凸解析とは
 - $M^{\#}$ 凹関数の定義と性質
- $M^{\#}$ 凹関数を用いたマッチングモデル
 - 割当モデル
 - 結婚モデル
 - 上下制限付き割当モデル

線形 & 離散凸マッチングモデル

評価関数 手付	線形	$M^{\#}$ 凹関数
自由	割当モデル [Shapley-Shubik 1972]	$M^{\#}$ 凹交差定理 [Murota 1996]
なし	結婚モデル [Gale-Shapley 1962]	[Eguchi-Fujishige '02] [Eguchi-Fujishige-T. '03]
上下限付き		[Fujishige-T. '07]

割当モデル

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$ } given
 $a = (a_{ij} : (i, j) \in E)$, $b = (b_{ij} : (i, j) \in E)$
(i, j) における i の利益 j の利益

割当モデル

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$
 $a = (a_{ij} : (i, j) \in E), b = (b_{ij} : (i, j) \in E)$ } given
(i, j) における i の利益 j の利益

(X, q, r) : (pairwise) 安定解 ($X \subseteq E, q \in \mathbf{R}^M, r \in \mathbf{R}^W$)

利得ベクトル $\Downarrow$ def

(a1) X : matching

(a2) $q_i + r_j = a_{ij} + b_{ij} \quad (\forall (i, j) \in X)$

(a3) $q, r \geq \mathbf{0}$ and $q_i = 0 (r_j = 0)$ if $i (j)$ is unmatched in X

(a4) $q_i + r_j \geq a_{ij} + b_{ij} \quad (\forall (i, j) \in E)$

割当問題(LP定式化)

Max. $\sum_{(i,j) \in E} (a_{ij} + b_{ij})x_{ij}$

s.t. $\sum_{j \in W} x_{ij} \leq 1 \quad (i \in M)$

$\sum_{i \in M} x_{ij} \leq 1 \quad (j \in W)$

$x_{ij} \geq 0 \quad ((i, j) \in E)$

双対問題

Min. $\sum_{i \in M} q_i + \sum_{j \in W} r_j$

s.t. $q_i + r_j \geq a_{ij} + b_{ij} \quad ((i, j) \in E)$

$q_i \geq 0 \quad (i \in M)$

$r_j \geq 0 \quad (j \in W)$

(a1) X : matching 主実行可能性

(a2) $q_i + r_j = a_{ij} + b_{ij} \quad (\forall (i, j) \in X)$ 相補性

(a3) $q, r \geq \mathbf{0}$ and $q_i = 0 (r_j = 0)$ if $i (j)$ is unmatched in X

(a4) $q_i + r_j \geq a_{ij} + b_{ij} \quad (\forall (i, j) \in E)$ 双対実行可能性

安定マッチングの存在証明

■ 線形計画問題の双対定理 + 整数性

- 割当問題は整数最適解 X をもつ
- 双対問題も最適解 (q, r) をもつ
- (X, q, r) が安定解

■ 最適化問題へと変換可能

- $M^{\#}$ 凹関数を用いた拡張でも成立

評価関数を用いた解釈

$$f_i(x) = \begin{cases} \sum_{j \in W} a_{ij} x_{ij} & (x \in \{0,1\}^{E(i)}, \sum_{j \in W} x_{ij} \leq 1) \\ -\infty & (\text{otherwise}) \end{cases} \quad (i \in M)$$

$$f_j(x) = \begin{cases} \sum_{i \in M} b_{ij} x_{ij} & (x \in \{0,1\}^{E(j)}, \sum_{i \in M} x_{ij} \leq 1) \\ -\infty & (\text{otherwise}) \end{cases} \quad (j \in W)$$

x : 安定マッチング $\Leftrightarrow x \in \arg \max (f_M + f_W)$

$$f_M = \sum_{i \in M} f_i, \quad f_W = \sum_{j \in W} f_j$$

これらの関数は層型凹関数, すなわち $M^{\#}$ 凹関数

線形 & 離散凸マッチングモデル

手付 \ 評価関数	線形	M ⁿ 凹関数
自由	割当モデル [Shapley-Shubik 1972]	M ⁿ 凹交差定理 [Murota 1996]
なし	結婚モデル [Gale-Shapley 1962]	[Eguchi-Fujishige '02] [Eguchi-Fujishige-T. '03]
上下限付き		[Fujishige-T. '07]

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

37

評価関数を用いた割当モデルの拡張

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$

$f_i: \{0,1\}^{E(i)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($i \in M$) i の評価関数 } given

$f_j: \{0,1\}^{E(j)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($j \in W$) j の評価関数

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

38

評価関数を用いた割当モデルの拡張

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$

$f_i: \{0,1\}^{E(i)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($i \in M$) i の評価関数 } given

$f_j: \{0,1\}^{E(j)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($j \in W$) j の評価関数

(A) $\text{dom } f_k$ ($k \in M \cup W$) は有界, 遺伝的,
 最小点として $\mathbf{0}$ を含む
 遺伝的: $\mathbf{0} \leq x_1 \leq x_2 \in \text{dom } f_k \Rightarrow x_1 \in \text{dom } f_k$

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

39

評価関数を用いた割当モデルの拡張

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$

$f_i: \{0,1\}^{E(i)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($i \in M$) i の評価関数 } given

$f_j: \{0,1\}^{E(j)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($j \in W$) j の評価関数

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

40

評価関数を用いた割当モデルの拡張

(x, s) : (pairwise) 安定解 $(x \in \{0,1\}^E, s \in \mathbf{R}^E)$
 $\Downarrow$ def
 (A1) $x_{(k)} \in \text{dom } f_k \quad (\forall k \in M \cup W)$ 実行可能割当
 (A2) $f_i[+s_{(i)}](x_{(i)}) = \max\{f_i[+s_{(i)}](y) \mid y \leq x_{(i)}\} \quad (\forall i \in M)$
 and $f_j[-s_{(j)}](x_{(j)}) = \max\{f_j[-s_{(j)}](y) \mid y \leq x_{(j)}\} \quad (\forall j \in W)$
 (A3) for $\forall (i, j) \in E, \forall \alpha \in \mathbf{R}$
 $f_i[+s_{(i)}](x_{(i)}) \geq \max\{f_i[+(s_{(i)}^{-j}, \alpha)](y) \mid y(i, j') \leq x(i, j'), \forall j' \neq j\}$
 or $f_j[-s_{(j)}](x_{(j)}) \geq \max\{f_j[-(s_{(j)}^{-i}, \alpha)](y) \mid y(i', j) \leq x(i', j), \forall i' \neq i\}$
 $x_{(k)}$: x の $E_{(k)}$ への制限, $(s_{(i)}^{-j}, \alpha)$: $s_{(i)}$ の j 成分を α に置換え

$M^{\#}$ 凹関数を用いた割当モデルの拡張

補題 $f_k (k \in M \cup W)$: 仮定(A)を満たす $M^{\#}$ 凹関数
 x : 実行可能割当に対し
 $\exists s \in \mathbf{R}^E$ s.t. (x, s) : 安定解
 $\Downarrow$
 $\exists p \in \mathbf{R}^E : x_{(i)} \in \arg \max f_i[+p_{(i)}] \quad (\forall i \in M)$
 $x_{(j)} \in \arg \max f_j[-p_{(j)}] \quad (\forall j \in W)$
 $\Downarrow$
 $\exists p \in \mathbf{R}^E : x \in \arg \max f_M[+p] \cap \arg \max f_W[-p]$
 $f_M = \sum_{i \in M} f_i, f_W = \sum_{j \in W} f_j$ (ともに $M^{\#}$ 凹関数)

安定割当の存在証明

$M^{\#}$ 凹交叉定理 [Murota 1996]

$f_M, f_W : \mathbf{Z}^E \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ $M^{\#}$ 凹関数

$x \in \arg \max (f_M + f_W)$

$\Downarrow$

$\exists p \in \mathbf{R}^E : x \in \arg \max f_M[+p] \cap \arg \max f_W[-p]$

$\text{dom } f_M \cap \text{dom } f_W$: 有界非空 $\Rightarrow \exists$ 安定割当

線形 & 離散凸マッチングモデル

手付 \ 評価関数	線形	$M^{\#}$ 凹関数
自由	割当モデル [Shapley-Shubik 1972]	$M^{\#}$ 凹交叉定理 [Murota 1996]
なし	結婚モデル [Gale-Shapley 1962]	[Eguchi-Fujishige '02] [Eguchi-Fujishige-T. '03]
上下限付き		[Fujishige-T. '07]

結婚モデル

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$
 $a = (a_{ij} : (i, j) \in E), b = (b_{ij} : (i, j) \in E)$ } given

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

45

結婚モデル

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$
 $a = (a_{ij} : (i, j) \in E), b = (b_{ij} : (i, j) \in E)$ } given

$a_{ij} > 0 \Leftrightarrow i \in M$ は j を **受理可能**
 $a_{ij} = -\infty \Leftrightarrow i \in M$ は j を **受理不可能**
 $a_{ij} > a_{ik} \Leftrightarrow i \in M$ は j を k より **好む**
 $a_{ij} = a_{ik} \Leftrightarrow i$ にとり j と k は **無差別**

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

46

結婚モデル

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$
 $a = (a_{ij} : (i, j) \in E), b = (b_{ij} : (i, j) \in E)$ } given

マッチング X : **(pairwise) 安定**

⇔ def

$\exists q \in \mathbf{R}^M, \exists r \in \mathbf{R}^W$ 利得ベクトル

(m1) $q_i = a_{ij}$ and $r_j = b_{ij}$ ($\forall (i, j) \in X$) 手付なし

(m2) $q, r \geq \mathbf{0}$ and $q_i = 0$ ($r_j = 0$) if i (j) is unmatched in X

(m3) $q_i \geq a_{ij}$ or $r_j \geq b_{ij}$ ($\forall (i, j) \in E$)

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

47

評価関数を用いた解釈

$$f_i(x) = \begin{cases} \sum_{j \in W} a_{ij} x_{ij} & (x \in \{0,1\}^{E(i)}, \sum_{j \in W} x_{ij} \leq 1) \\ -\infty & (\text{otherwise}) \end{cases} \quad (i \in M)$$

$$f_j(x) = \begin{cases} \sum_{i \in M} b_{ij} x_{ij} & (x \in \{0,1\}^{E(j)}, \sum_{i \in M} x_{ij} \leq 1) \\ -\infty & (\text{otherwise}) \end{cases} \quad (j \in W)$$

x : 安定マッチング ⇔

$\exists z_M, z_W \in \{0,1\}^E : z_M \vee z_W = \mathbf{1}$,

$x \in \arg \max \{f_M(y) \mid y \leq z_M\} \cap \arg \max \{f_W(y) \mid y \leq z_W\}$
 $(x \vee y)(e) = \max \{x(e), y(e)\}$

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

48

線形 & 離散凸マッチングモデル

手付 \ 評価関数	線形	M ⁿ 凹関数
自由	割当モデル [Shapley-Shubik 1972]	M ⁿ 凹交差定理 [Murota 1996]
なし	結婚モデル [Gale-Shapley 1962]	[Eguchi-Fujishige '02] [Eguchi-Fujishige-T. '03]
上下限付き		[Fujishige-T. '07]

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

49

評価関数を用いた結婚モデルの拡張

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$

$f_i: \{0,1\}^{E(i)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($i \in M$) i の評価関数 } given

$f_j: \{0,1\}^{E(j)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($j \in W$) j の評価関数

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

50

評価関数を用いた結婚モデルの拡張

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$

$f_i: \{0,1\}^{E(i)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($i \in M$) i の評価関数 } given

$f_j: \{0,1\}^{E(j)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($j \in W$) j の評価関数

(A) $\text{dom } f_k$ ($k \in M \cup W$) は有界, 遺伝的,
最小点として $\mathbf{0}$ を含む

遺伝的: $\mathbf{0} \leq x_1 \leq x_2 \in \text{dom } f_k \Rightarrow x_1 \in \text{dom } f_k$

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

51

評価関数を用いた結婚モデルの拡張

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$

$f_i: \{0,1\}^{E(i)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($i \in M$) i の評価関数 } given

$f_j: \{0,1\}^{E(j)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($j \in W$) j の評価関数

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

52

評価関数を用いた結婚モデルの拡張

$x \in \{0,1\}^E$: (pairwise) 安定割当
 $\Updownarrow$ def
 (M1) $x_{(k)} \in \text{dom } f_k$ ($\forall k \in M \cup W$) 実行可能割当
 (M2) $f_i(x_{(i)}) = \max\{f_i(y) \mid y \leq x_{(i)}\}$ ($\forall i \in M$)
 and $f_j(x_{(j)}) = \max\{f_j(y) \mid y \leq x_{(j)}\}$ ($\forall j \in W$)
 (M3) for $\forall (i, j) \in E$,
 $f_i(x_{(i)}) \geq \max\{f_i(y) \mid y(i, j') \leq x(i, j'), \forall j' \neq j\}$
 or $f_j(x_{(j)}) \geq \max\{f_j(y) \mid y(i', j) \leq x(i', j), \forall i' \neq i\}$
 $x_{(k)} : x$ の $E_{(k)}$ への制限

$M^{\#}$ 凹関数を用いた結婚モデルの拡張

補題 f_k ($k \in M \cup W$): 仮定(A)を満たす $M^{\#}$ 凹関数.
 x : 実行可能割当に対し
 x : 安定割当
 $\Updownarrow$
 $\exists z_M, z_W \in \{0,1\}^E : z_M \vee z_W = \mathbf{1}$,
 $x \in \arg \max\{f_M(y) \mid y \leq z_M\} \cap \arg \max\{f_W(y) \mid y \leq z_W\}$
 $f_M = \sum_{i \in M} f_i, f_W = \sum_{j \in W} f_j$ (ともに $M^{\#}$ 凹関数)
 $(x \vee y)(e) = \max\{x(e), y(e)\}$

Gale-Shapleyアルゴリズムの一般化

$z_M := \mathbf{1}, z_W := \mathbf{0}, x_W := \mathbf{0}$;
repeat {
 select $x_M \in \arg \max\{f_M(y) \mid x_W \leq y \leq z_M\}$;
 select $x_W \in \arg \max\{f_W(y) \mid y \leq x_M\}$;
 for each $e \in E$ with $x_M(e) > x_W(e)$ {
 $z_M(e) := 0, z_W(e) := 1$;
 }
until $x_M = x_W$;
return $(x_M, z_M, z_W \vee x_M)$.

f_M と f_W が仮定(A)を満たし
 $M^{\#}$ 凹関数ならば,
 安定割当を求める

線形 & 離散凸マッチングモデル

手付 \ 評価関数	線形	$M^{\#}$ 凹関数
自由	割当モデル [Shapley-Shubik 1972]	$M^{\#}$ 凹交差定理 [Murota 1996]
なし	結婚モデル [Gale-Shapley 1962]	[Eguchi-Fujishige '02] [Eguchi-Fujishige-T. '03]
上下限付き		[Fujishige-T. '07]

上下限制約付き割当モデル

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$
 $a = (a_{ij} : (i, j) \in E), b = (b_{ij} : (i, j) \in E)$ } given
 $\underline{\pi} \in (\mathbf{R} \cup \{-\infty\})^E, \bar{\pi} \in (\mathbf{R} \cup \{+\infty\})^E$ with $\underline{\pi} \leq \bar{\pi}$

W側からM側への手付の下限

W側からM側への手付の上限

上下限制約付き割当モデル

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$
 $a = (a_{ij} : (i, j) \in E), b = (b_{ij} : (i, j) \in E)$ } given
 $\underline{\pi} \in (\mathbf{R} \cup \{-\infty\})^E, \bar{\pi} \in (\mathbf{R} \cup \{+\infty\})^E$ with $\underline{\pi} \leq \bar{\pi}$

上下限制約付き割当モデル

M, W : 主体の集合, $E = M \times W$
 $a = (a_{ij} : (i, j) \in E), b = (b_{ij} : (i, j) \in E)$ } given
 $\underline{\pi} \in (\mathbf{R} \cup \{-\infty\})^E, \bar{\pi} \in (\mathbf{R} \cup \{+\infty\})^E$ with $\underline{\pi} \leq \bar{\pi}$

(X, q, r) (pairwise) 安定解 ($X \subseteq E, q \in \mathbf{R}^M, r \in \mathbf{R}^W$)

⇕ def

(b1) X : matching

(b2) $q_i = a_{ij} + s_{ij}, r_j = b_{ij} - s_{ij}, \underline{\pi}_{ij} \leq s_{ij} \leq \bar{\pi}_{ij}$ ($\forall (i, j) \in X$)

(b3) $q, r \geq \mathbf{0}$ and $q_i = 0$ ($r_j = 0$) if i (j) is unmatched in X

(b4) $q_i \geq a_{ij} + \alpha$ or $r_j \geq b_{ij} - \alpha$ ($\forall (i, j) \in E, \forall \alpha \in [\underline{\pi}_{ij}, \bar{\pi}_{ij}]$)

割当モデルとの関係

(b1) X : matching

(b2) $q_i = a_{ij} + s_{ij}, r_j = b_{ij} - s_{ij}, \underline{\pi}_{ij} \leq s_{ij} \leq \bar{\pi}_{ij}$ ($\forall (i, j) \in X$)

(b3) $q, r \geq \mathbf{0}$ and $q_i = 0$ ($r_j = 0$) if i (j) is unmatched in X

(b4) $q_i \geq a_{ij} + \alpha$ or $r_j \geq b_{ij} - \alpha$ ($\forall (i, j) \in E, \forall \alpha \in [\underline{\pi}_{ij}, \bar{\pi}_{ij}]$)

⇕ $\underline{\pi} = (-\infty, \dots, -\infty), \bar{\pi} = (+\infty, \dots, +\infty)$

(a1) X : matching

(a2) $q_i + r_j = a_{ij} + b_{ij}$ ($\forall (i, j) \in X$)

(a3) $q, r \geq \mathbf{0}$ and $q_i = 0$ ($r_j = 0$) if i (j) is unmatched in X

(a4) $q_i + r_j \geq a_{ij} + b_{ij}$ ($\forall (i, j) \in E$)

結婚モデルとの関係

- (b1) X : matching
- (b2) $q_i = a_{ij} + s_{ij}, r_j = b_{ij} - s_{ij}, \underline{\pi}_{ij} \leq s_{ij} \leq \bar{\pi}_{ij} (\forall (i, j) \in X)$
- (b3) $q, r \geq \mathbf{0}$ and $q_i = 0 (r_j = 0)$ if $i (j)$ is unmatched in X
- (b4) $q_i \geq a_{ij} + \alpha$ or $r_j \geq b_{ij} - \alpha (\forall (i, j) \in E, \forall \alpha \in [\underline{\pi}_{ij}, \bar{\pi}_{ij}])$

$$\Updownarrow \quad \underline{\pi} = (0, \dots, 0), \quad \bar{\pi} = (0, \dots, 0)$$

- $\exists q \in \mathbf{R}^M, \exists r \in \mathbf{R}^W (X : \text{matching})$
- (m1) $q_i = a_{ij}$ and $r_j = b_{ij} (\forall (i, j) \in X)$
- (m2) $q, r \geq \mathbf{0}$ and $q_i = 0 (r_j = 0)$ if $i (j)$ is unmatched in X
- (m3) $q_i \geq a_{ij}$ or $r_j \geq b_{ij} (\forall (i, j) \in E)$

安定解の存在

- 次のモデルにおける安定解の存在より導かれる

線形 & 離散凸マッチングモデル

手付 \ 評価関数	線形	M ⁿ 凹関数
自由	割当モデル [Shapley-Shubik 1972]	M ⁿ 凹交差定理 [Murota 1996]
なし	結婚モデル [Gale-Shapley 1962]	[Eguchi-Fujishige '02] [Eguchi-Fujishige-T. '03]
上下限付き		[Fujishige-T. '07]

FTモデル

$f_i: \mathbf{Z}^{E(i)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ 評価関数, $E_{(i)} = \{(i, j') \mid j' \in Q\}$

$f_j: \mathbf{Z}^{E(j)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ 評価関数, $E_{(j)} = \{(i', j) \mid i' \in P\}$

“安定”な割当(多対多, 複数労働時間)と給与は存在するか

FTモデル

P, Q : 主体の集合, $E = P \times Q$
 $f_i : \mathbf{Z}^{E(i)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($i \in P$) i の評価関数
 $f_j : \mathbf{Z}^{E(j)} \rightarrow \mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ ($j \in Q$) j の評価関数
 $\underline{\pi} \in (\mathbf{R} \cup \{-\infty\})^E, \bar{\pi} \in (\mathbf{R} \cup \{+\infty\})^E$ ($\underline{\pi} \leq \bar{\pi}$)

given

(A) $\text{dom } f_k$ ($k \in P \cup Q$) は有界, 遺伝的,
 最小点として $\mathbf{0}$ を含む
 遺伝的: $\mathbf{0} \leq x_1 \leq x_2 \in \text{dom } f_k \Rightarrow x_1 \in \text{dom } f_k$

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

65

実行可能割当, 実行可能給与ベクトル

■ **実行可能割当** $x \in \mathbf{Z}^E$

$$x_{(k)} \in \text{dom } f_k \quad (k \in P \cup Q)$$

$x_{(k)}$: x の $E_{(k)}$ への制限

■ **実行可能給与ベクトル** $s \in \mathbf{R}^E$

$$\underline{\pi} \leq s \leq \bar{\pi}$$

■ **解** (x, s) 実行可能割当 & 実行可能給与ベクトル

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

66

動機制約

■ (x, s) : **動機制約**(incentive constraints)

$$f_i[+s_{(i)}](x_{(i)}) = \max \{f_i[+s_{(i)}](y) \mid y \leq x_{(i)}\} \quad (\forall i \in P)$$

$$f_j[-s_{(j)}](x_{(j)}) = \max \{f_j[-s_{(j)}](y) \mid y \leq x_{(j)}\} \quad (\forall j \in Q)$$

$$f[+s](x) = f(x) + \sum_e s(e)x(e)$$

各主体は現在の給与に対して, 労働時間を減らす
 動機をもたない

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

67

不安定解

■ **(pairwise) 不安定解** (x, s) :

動機制約を満たさない あるいは

$\exists (i, j) \in E, \alpha \in [\underline{\pi}(i, j), \bar{\pi}(i, j)], y' \in \mathbf{Z}^{E(i)}, y'' \in \mathbf{Z}^{E(j)}$:

$$f_i[+s_{(i)}](x_{(i)}) < f_i[+(s_{(i)}^{-j}, \alpha)](y')$$

$$y'(i, j') \leq x(i, j') \quad (\forall j' \in Q - \{j\})$$

$$f_j[-s_{(j)}](x_{(j)}) < f_j[-(s_{(j)}^{-i}, \alpha)](y'')$$

$$y''(i', j) \leq x(i', j) \quad (\forall i' \in P - \{i\})$$

$$y'(i, j) = y''(i, j)$$

$(s_{(i)}^{-j}, \alpha)$: replaced j -comp. of $s_{(i)}$ by α

2010-7-17

早稲田木曜セミナー

68

準不安定解

■ (pairwise) 準不安定解 (x, s) :

動機制約を満たさないあるいは

$\exists (i, j) \in E, \alpha \in [\underline{\pi}(i, j), \overline{\pi}(i, j)], y' \in \mathbf{Z}^{E(i)}, y'' \in \mathbf{Z}^{E(j)}$:

$$f_i[+s_{(i)}](x_{(i)}) < f_i[+(s_{(i)}^-, \alpha)](y')$$

$$y'(i, j') \leq x(i, j') \quad (\forall j' \in Q - \{j\})$$

$$f_j[-s_{(j)}](x_{(j)}) < f_j[-(s_{(j)}^-, \alpha)](y'')$$

$$y''(i', j) \leq x(i', j) \quad (\forall i' \in P - \{i\})$$

不安定解 $\Rightarrow$ 準不安定解 $(s_{(i)}^-, \alpha)$: replaced j -comp. of $s_{(i)}$ by α

安定解, 厳安定解

■ (pairwise) 安定解 (x, s) : 不安定でない解

■ (pairwise) 厳安定解 (x, s) : 準不安定でない解

厳安定解 $\Rightarrow$ 安定解

安定性 対 厳安定性 (1)

補題

$f_k (k \in P \cup Q)$: 仮定(A) を満たす $M^{\#}$ 凹関数

(i) $\underline{\pi} = \overline{\pi}$

or

(ii) $\text{dom } f_k \subseteq \{0, 1\}^{E(k)} \quad (\forall k \in P \cup Q)$

$\Downarrow$

すべての安定解は厳安定

安定性 対 厳安定性 (2)

定理

$f_k (k \in P \cup Q)$: 仮定(A) を満たす $M^{\#}$ 凹関数

任意の安定解 (x, s) に対して,

ある実行可能給与ベクトル s' が存在し

(x, s') が厳安定解となる

主定理(安定解の存在)

定理

$f_k (k \in P \cup Q)$: (A)を満たす $M^{\#}$ 凹関数
常に厳安定解が存在する

(A) $\text{dom } f_k (k \in P \cup Q)$ は有界, 遺伝的,
最小点として $\mathbf{0}$ を含む

遺伝的: $\mathbf{0} \leq x_1 \leq x_2 \in \text{dom } f_k \Rightarrow x_1 \in \text{dom } f_k$

厳安定性の特徴付け

$f_k (k \in P \cup Q)$: (A)を満たす $M^{\#}$ 凹関数, x : 実行可能割当

$\exists s \in \mathbf{R}^E$ s.t. (x, s) : 厳安定 $\Leftrightarrow$

$\exists p \in \mathbf{R}^E, z_p = (z_{(i)} \mid i \in P), z_Q = (z_{(j)} \mid j \in Q) \in (\mathbf{Z} \cup \{+\infty\})^E :$

$$x_{(i)} \in \arg \max \{f_i[+p_{(i)}](y) \mid y \leq z_{(i)}\} \quad (\forall i \in P)$$

$$x_{(j)} \in \arg \max \{f_j[-p_{(j)}](y) \mid y \leq z_{(j)}\} \quad (\forall j \in Q)$$

$$\underline{\pi} \leq p \leq \bar{\pi}$$

$$z_p(e) < +\infty \Rightarrow p(e) = \underline{\pi}(e), z_Q(e) = +\infty$$

$$z_Q(e) < +\infty \Rightarrow p(e) = \bar{\pi}(e), z_p(e) = +\infty$$

関連文献 & 図書

- J. W. Hatfield and P. R. Milgrom: Matching with contracts, American Economic Review, 95 (2005), 913-935.
- S. Fujishige and A. Tamura: A two-sided discrete-concave market with possibly bounded side payments: An approach by discrete convex analysis, Mathematics of Operations Research, 32 (2007), 136-154.
- K. Murota: Discrete Convex Analysis, SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications, Vol. 10, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2003.
- S. Fujishige: Submodular Functions and Optimization, 2nd ed., Annals of Discrete Mathematics, 58, Elsevier, Amsterdam, 2005.
- 室田一雄: 離散凸解析の考えかた —最適化における離散と連続の数理—, 共立出版, 2007.